КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ В ДЕРМАТОЛОГИИ: АНАЛИЗ 22 509 ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Б.Б. ЭРНАЗАРОВ[1], К.А. АБДУЛЛАХОДЖАЕВ[2], Ш.Ш. ХОНХОДЖАЕВ[3]
[1,2,3]Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр дерматовенерологии и косметологии, г. Ташкент, Узбекистан

DOI: 10.67620/dermajournal.1730023

Актуальность. Совпадение клинического и гистологического диагнозов принято считать одним из показателей качества дерматологической диагностики. Однако направление на биопсию нередко содержит несколько предполагаемых диагнозов, и итоговый показатель во многом зависит от того, как считать совпадение.

Цель исследования. Оценить клинико-морфологическое соответствие и выявить нозологии с наибольшим расхождением.

Материал и методы исследования. Ретроспективно изучены 24 175 патогистологических заключений центра за 2023–2025 гг. Направительные диагнозы (до трёх) и гистологические заключения были сгруппированы по словарю синонимов в 55 нозологических групп; это удалось сделать для 22 509 заключений. Совпадение рассчитывали двумя способами: с первым диагнозом направления и с любым из указанных.

Результаты исследования. Гистологический диагноз совпал хотя бы с одним из направительных в 86,0 % случаев, а с первым диагнозом — лишь в 64,0 %. В 58,6 % направлений было указано три диагноза; для них совпадение составило 85,0 и 59,0 % соответственно.

Мы отдельно рассмотрели нозологии, которые стояли первыми в направлении не менее 30 раз. Реже всего гистологически подтверждались меланома (1 из 35) и лимфома кожи (13 из 90); в 38 случаях с направительным диагнозом лимфомы морфолог заключил атопический дерматит. Низким было совпадение и при красном волосяном лишае Девержи (8 из 47), парапсориазе (12 из 46) и дерматите Дюринга (16 из 50). Себорейный дерматит подтвердился в 154 из 431 случаев, а в 186 гистологическая картина соответствовала псориазу.

Наиболее частыми были расхождения между псориазом и экземой. При направительном диагнозе псориаза морфолог описал экзему в 472 из 5 343 случаев, при направительной экземе обнаружил псориаз в 348 из 1 384. При витилиго в 416 из 2 419 случаев было дано заключение о гипомеланозе.

Выводы. Если учитывать весь дифференциальный ряд, расхождение составляет 14 %, если только первый диагноз — 36 %. Поэтому совпадение с первым диагнозом точнее отражает качество клинической диагностики. Наибольшие трудности вызывают лимфомы кожи и папулосквамозные дерматозы. Следует учитывать, что морфолог знал направительный диагноз, а при части нозологий гистологическая картина малоспецифична.