ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОНИХОМИКОЗА В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПЯТИЛЕТНИЙ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

DSc., доцент Имамов Отабек Суннатович[1], DSc., Абдувахитова Индира Нуруллаевна[2], Абдумўминов Азизбек Ойбек ўғли[3]

DOI: 10.67620/dermajournal.1730046

Ключевые слова: *онихомикоз, микоз ногтей, дерматомикозы, эпидемиология, заболеваемость, Сурхандарьинская область, территориальный анализ, дерматовенерология.*

Актуальность. Онихомикоз — одна из наиболее распространённых хронических инфекций ногтевого аппарата, характеризующаяся длительным и рецидивирующим течением, что обусловливает необходимость продолжительного лечения и динамического наблюдения за пациентами. Изучение региональных эпидемиологических и территориальных особенностей распространения онихомикоза имеет существенное значение как для объективной оценки эпидемиологической ситуации, так и для научного обоснования планирования специализированной дерматовенерологической помощи и определения потребности населения в диагностических и лечебных мероприятиях.

Цель исследования. Изучить динамику заболеваемости и территориальные особенности распространения онихомикоза в Сурхандарьинской области за период 2020–2024 гг. на основе ретроспективного анализа отчётных данных.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный эпидемиологический анализ отчётных данных по дерматомикозам в Сурхандарьинской области за 2020–2024 гг. Изучены абсолютное число зарегистрированных случаев онихомикоза, их распределение по городам и районам области, а также половозрастная структура пациентов по данным за 2024 год. Для оценки динамики заболеваемости рассчитывались абсолютные и относительные (в процентах) показатели прироста числа зарегистрированных случаев по годам. Сопоставление данных за различные годы проводилось с учётом изменений в структуре статистической отчётности.

Результаты. За анализируемый период установлен последовательный рост числа зарегистрированных случаев онихомикоза: с 57 в 2020 г. до 121 в 2021 г., 168 в 2022 г., 203 в 2023 г. и 214 в 2024 г. Таким образом, за пять лет заболеваемость возросла в 3,8 раза (на 157 случаев, или 275,4%). Наиболее выраженный прирост зарегистрирован в начале анализируемого периода: в 2021 г. по сравнению с 2020 г. число случаев увеличилось на 112,3%, в 2022 г. — ещё на 38,8%. В последующие годы темпы прироста постепенно снижались (20,8% в 2023 г. и 5,4% в 2024 г.), однако общая динамика на протяжении всего периода оставалась положительной.

Анализ территориального распределения выявил выраженную неоднородность регистрации онихомикоза по районам области. В 2024 г. наибольшее число случаев зарегистрировано в Деновском районе — 58 (27,1% всех случаев по области), далее следовали Жаркурганский район — 24 случая (11,2%) и г. Термез — 21 случай (9,8%). На долю указанных трёх территорий пришлось 48,1% всех зарегистрированных случаев онихомикоза за год. В отдельных районах отмечена устойчивая тенденция к росту заболеваемости: в Деновском районе число случаев увеличилось с 2 в 2020 г. до 58 в 2024 г., в Жаркурганском

районе — с 3 до 24. Неравномерность динамики по территориям указывает на необходимость учёта районных особенностей при планировании специализированной помощи.

Согласно данным 2024 г., среди пациентов с впервые выявленным онихомикозом преобладали мужчины — 134 человека (62,6%), женщины составили 80 человек (37,4%). Наиболее многочисленными были возрастные группы 21–25 лет (55 пациентов, 25,7%), 26–29 лет (45 пациентов, 21,0%) и 30–39 лет (34 пациента, 15,9%); в целом на возраст 18–39 лет пришлось 163 случая (76,2%). Среди детей и подростков до 18 лет зарегистрирован 21 случай (9,8%). Подавляющее большинство пациентов — 193 из 214 (90,2%) — являлись жителями сельской местности, что необходимо учитывать при организации раннего выявления заболевания и обеспечении доступности специализированной дерматологической и микологической помощи на районном уровне.

Заключение. Проведённый анализ показал устойчивый рост числа зарегистрированных случаев онихомикоза в Сурхандарьинской области в 2020–2024 гг. (с 57 до 214), сопровождающийся выраженными территориальными различиями с концентрацией заболеваемости в Деновском и Жаркурганском районах и г. Термезе. В структуре заболевших в 2024 г. преобладали мужчины трудоспособного возраста и жители сельской местности. Полученные данные обосновывают необходимость совершенствования системы раннего выявления онихомикоза, повышения доступности микологической диагностики на районном уровне и разработки дифференцированной маршрутизации пациентов, а территории с наибольшей заболеваемостью целесообразно рассматривать в качестве приоритетных при организации специализированной помощи и внедрении современных методов комплексного лечения.