РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021–2025 ГГ.

А.И. ЯКУБОВИЧ[1], А.Ю. ЧАЩИН[2], П.С. ЮГОВА[3], Н.А. ШПАКОВА[4]
[1,2,3]Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия
[4]Областной кожно-венерологический диспансер, Иркутск, Россия

DOI: 10.67620/dermajournal.1730212

Актуальность: Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), являются важной социально-значимой группой заболеваний, отражающей уровень жизни населения и оказывающей существенное влияние на репродуктивное здоровье. К таким инфекциям относится в первую очередь хламидийная инфекция. Изучение динамики распространенности хламидийной инфекции в Иркутской области имеет существенное значение для оценки эффективности существующих профилактических и диагностических мероприятий, а также для формирования стратегии предупреждения распространения заболевания.

Среди ИППП в Российской Федерации за последние двадцать лет сохранилось снижение заболеваемости гонококковой инфекцией, трихомониазом и вирусными инфекциями, передаваемыми половым путем. В Иркутской области значимого снижения не отмечено, особенно по хламидиозу и в 2021 году заболеваемость в данном регионе на 100000 населения была выше показателей по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу в 3,5 раза.

Цель исследования. Изучение эпидемиологической ситуации по хламидиозу в ИО в период пандемии COVID-19 (2021–2022 гг.) и после неё (2023–2025 гг.).

Материалы и методы исследования. В качестве основного материала использовались годовые отчёты ОКВД г. Иркутска.

Результаты. Заболеваемость урогенитальным хламидиозом в Иркутской области, в 2021 году составила 65,1 на 100 000 населения; в 2022 г. интенсивный показатель снизился до 52,3; в постпандемийный период в 2023 г. отмечен рост до 56,9, а в 2024 г. составил 61,1.

Следует отметить, что на эпидемиологический процесс распространения хламидиоза в Иркутской области специфическое влияние оказала пандемия COVID-19. Но превышение показателя заболеваемости более чем в 3 раза, в сравнении с данными по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу, сохранилось. Уровень заболеваемости хламидийной инфекцией в Российской Федерации в 2024 году стал на 2,35 выше, чем в 2022 и 2023 гг (17,5 в 2024г. по сравнению с 17,1 на 100 тыс. населения в 2022 и 2023 гг.). В Сибирском федеральном округе за соответствующий период отмечен рост заболеваемости на 2,2% (17,8 в 2024 г. по сравнению с 17,4 на 100 тыс. населения в 2022г.). В 2022 гг. в Иркутской области уровень заболеваемости хламидийной инфекцией стал выше на 14,4% (61,1 в 2024 г. по сравнению с 52,1 на 100 тыс. населения в 2022г.). В 2025 году в Иркутской области было выявлено 2015 больных урогенитальной хламидийной инфекцией, а заболеваемость выросла на 29,5%.

Выводы. Таким образом, в ходе анализа статистических данных за период с 2021 по 2025 год можно отметить, что Иркутская область сохраняет высокие показатели по заболеваемости хламидийной инфекцией среди регионов Сибирского федерального округа с продолжающимся ростом, что диктует необходимость постоянного анализа эпидемиологической ситуации и адаптации профилактических программ, направленных на снижение уровня заболеваемости.