КРЕМ «ДЕКЛОСИД» У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ ИНФИЛЬТРАТИВНО - НАГНОИТЕЛЬНОЙ ТРИХОФИТИЕЙ ГЛАДКОЙ КОЖИ И ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ

Фозилов Ф.А.
Андижанский Государственный медицинский институт. Кафедра дерматовенерологии

DOI: 10.67620/dermajournal.1730036

Цель исследования: Изучить клиническую эффективность крема «Деклосид» у больных инфильтративно – нагноительной формы трихофитии гладкой кожи и волосистой части головы.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находились 42 больных инфильтративно-нагноительной формой трихофитии. Возраст больных варьировало от 6 до 39 лет, мужчин было 28, женщин - 14. У 19 больных процесс локализовался на волосистой части головы, у 16 на гладкой коже, у 7 сочетанное поражение волосистой части головы и гладкой кожи. У всех больных диагноз был подтвержден лабораторно обнаружением на мазках мицелий грибов. Крем «Деклосид» фирмы «World medicine» применялся наружно 2 раза в день (утром и вечером) путём аппликации в очаги поражения тонким слоем под повязку. Кожу вокруг очага поражения обрабатывали 5% спиртовым раствором йода. Все больные кроме местной терапии получили общее лечение системными фунгицидными препаратами: тербинокс, тербезил и гризеофульвин в общепринятой дозе 2 - 3 недели. Кроме этих препаратов больные по показаниям получили антибиотики, витаминотерапию, антигистаминные и противовоспалительные препараты.

Результат: К концу первой недели у большинства больных кожный процесс значительно улучшился, очаги поражения очищались от гноя, эритема уменьшился, инфильтрация заметно уплощался. К концу лечения у всех больных кожный процесс полностью регрессировался.

Заключение: Таким образом, наши наблюдения показывают, что крем «Деклосид» является высокоэффективным средством для наружного лечения больных инфильтративно-нагноительной формой трихофитии гладкой кожи и волосистой части головы.